

Avertissements agricoles

DLP 14-5-84301543

**POITOU
CHARENTES**


BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 49 (8.84) du 7 MAI 1984

COLZA

➡ PUCERONS CENDRES : un risque toujours actuel

Des colonies de pucerons cendrés sont observées en de nombreuses situations. Un traitement est recommandé dès que l'on observe deux colonies par m². La période de sensibilité s'étend jusqu'à 3-4 semaines avant la récolte. Intervenir le plus rapidement possible si nécessaire avec des produits à bonne action de vapeur (bromophos, pyrimicarbe).

➡ CHARANCON DES SILIQUES :

L'activité de ces insectes reste assez faible cette année. Cependant une surveillance est nécessaire jusqu'au stade : "Dix premières siliques bosselées". Si des attaques sérieuses de cécidomyies ont été notées les années précédentes le seuil d'un charançon par plante est ramené à un charançon pour cinq plantes.

En cas de traitement utiliser des produits ayant le


LABEL " NON DANGEREUX POUR LES ABEILLES " .

Réaliser les traitements en dehors des heures de butinage actif.

CEREALES

➡ MALADIES DU BLE

- La maladie la plus préoccupante est la septoriose.
Dans toutes les zones on trouve l'étage foliaire numéro quatre atteint. Une progression sur la feuille numéro trois est observée sur certaines parcelles. La zone des groies de Nord-Charente est la moins touchée.
- L'oïdium connaît un développement important en certaines situations à sols (groies légères), microclimats et variétés (Hardi, Cocagne, Talent ...) favorables.
- Un piétin-verse tardif apparaît dans certaines parcelles : en tenir compte pour le choix des produits.



Les décisions d'intervention doivent tenir compte de la progression des maladies et non du stade : un traitement s'impose lorsque la feuille trois commence à être attaquée. Il est en effet impératif de garder verte les deux dernières feuilles.

P.1.14



SERVICE DE LA PROTECTION
DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS
Tél. : (49) 58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : R. GUILLEMET
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel 92 F.
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

Stratégie à suivre :

- . Pour les blés les plus avancés, proches de l'épiaison, un traitement avec un produit performant risque d'être indispensable.
- . Pour les blés qui sont à peine au gonflement, il sera souvent utile, lorsqu'aucune intervention n'a encore été réalisée ou date de plus de trois semaines, d'effectuer une protection contre la septoriose.
- . Si un traitement en cours de montaison a été réalisé, attendre l'épiaison avant de réintervenir.

MALADIES DES ORGES

- . L'helminthosporiose semble stoppée. Les dernières pluies risquent d'accélérer son développement.
- . La rhynchosporiose est la maladie dominante avec, par endroits, la rouille naine.

Lorsque aucun traitement n'a été réalisé, il peut être utile d'intervenir rapidement si la sécheresse n'a pas trop diminué les espérances de rendement. Là encore, le critère de décision est la présence de la maladie sur la feuille numéro trois.

Attention : sur Barberousse, il est fréquent de trouver des taches noires qui ne sont pas de l'helminthosporiose. En conséquence les produits n'ont pas d'efficacité sur ces symptômes.



SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1984

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.

Les décisions d'intervention doivent tenir compte de la progression des maladies et non du stade : un traitement n'est imposé lorsque la feuille trois commence à être atteinte. Il est en effet impératif de garder vertes les deux dernières feuilles.

